



12°
CONGRESO

DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA HEPATO PANCREATO BILIAR

INTRODUCCIÓN

Se define a la hepatolitiasis como la presencia de litos biliares alojados en los conductos hepáticos. Existen nuevas opciones farmacoterapéuticas pero son limitadas y solo de apoyo. La intervención endoscópica sigue siendo crucial para la extracción de cálculos impactados, aunque nuevas técnicas como la exploración de vía biliar con litotricia representan una mejor alternativa. Aunque la hepatectomía de la porción afectada del hígado ofrece una terapia definitiva, existen modalidades menos invasivas. La hepatolitiasis crónica es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de colangiocarcinoma intrahepático por lo que su diagnóstico y adecuado tratamiento son cruciales para la prevención de complicaciones graves.

CASO CLÍNICO

Masculino de 69 años con antecedente de hipertensión. Presenta cuadro de 1 semana de evolución con dolor abdominal en hipocondrio derecho, náuseas y malestar general. Ultrasonido hepático reporta dilatación de la vía biliar intrahepática de hasta 4 mm y del colédoco de 10 mm de diámetro. Vesícula biliar de 106x31x37 mm en sus ejes mayores, volumen calculado 106 cc de contenido litiasico. Se realiza tratamiento quirúrgico con exploración laparoscópica de vía biliar por vía transcística, encontrando lito impactado en conducto hepático izquierdo extrayéndose mediante cateterización y litotripsia. Se corrobora permeabilidad de la vía biliar hepática con colangioscopio. Se inserta sonda en T hacia conducto colédoco y hepático común. Evoluciona favorablemente en el postquirúrgico.




Título Tratamiento laparoscópico de hepatolitiasis: a propósito de un caso

Autor: Vargas Avila Arcenio Luis

Coautores: Morales Tercero Yunuen Ailyn, Belman Flores Alma Berenice, Tenorio Argüelles Guillermo, Bautista Herrera Cassandra Yuli, Castillejos Marquez Yazmin Shantal, Salgado Arzate Silvia Jacqueline, Vargas Flores Julian

Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza, ISSSTE



DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Para la hepatolitiasis sintomática o asintomática con signos de atrofia hepática o malignidad, se necesita una intervención quirúrgica, especialmente cuando la colangioscopia peroral y la litotomía colangioscópica transhepática percutánea no son adecuadas o no se pueden realizar. Actualmente, la cirugía laparoscópica está reemplazando gradualmente a la cirugía abierta tradicional y convirtiéndose en una mejor opción. Se han desarrollado varios tipos de cirugías laparoscópicas, incluida la hepatectomía laparoscópica, la exploración biliar laparoscópica a través del conducto biliar común o del muñón del conducto hepático y la cirugía laparoscópica asistida por robot, para el tratamiento de la hepatolitiasis simple, la hepatolitiasis concomitante con coledocolitiasis, la hepatolitiasis recurrente y hepatolitiasis complicada

REFERENCIAS

1. Yao D, Wu S. Application of Laparoscopic Technique in the Treatment of Hepatolithiasis. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020 Nov 25
2. Li R, Shan B, Tian K, Zhang X, Xie X. Biliary tract exploration via left hepatic duct stump versus the common bile duct incision in left-sided hepatolithiasis: a meta-analysis. ANZ J Surg. 2021 Jul;91(7-8)
3. Li H, Zheng J, Cai JY, Li SH, Zhang JB, Wang XM, Chen GH, Yang Y, Wang GS. Laparoscopic VS open hepatectomy for hepatolithiasis: An updated systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2017 Nov 21;23(43)