



12°
CONGRESO
DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA HEPATO PANCREATO BILIAR



Manejo de Emergencia de un Tumor Rabdoide Hepático Presentado con Hemorragia

Intraabdominal: Un Informe de Caso

Méndez Huerta Néstor Veriel, Muñoz Morales Gerardo Iván, Valdez Navarro Pamela Denisse, García López José Antonio, Vasquez Fernández Francisco, Muñoz Maldonado Gerardo Enrique, Hernández Guedea Marco Antonio

Hospital Universitario, “José Eleuterio González”

INTRODUCCIÓN

El tumor rabdoide hepático es una entidad patológica extremadamente rara y agresiva, con potencial metastásico elevado y mal pronóstico, principalmente observado en pediatría. Presentamos un caso de tumor rabdoide hepático en una mujer adulta, destacando su presentación inusual y las estrategias de manejo quirúrgico.

Describir el manejo quirúrgico y los resultados clínicos de un tumor rabdoide hepático en una paciente adulta, presentado como una emergencia por hemorragia intraabdominal, y discutir los desafíos diagnósticos y terapéuticos asociados con esta rara entidad.




Fig.3 Imagen transoperatoria de tumoración hepática.

MATERIAL Y MÉTODOS

Paciente femenina de 45 años ingresada por dolor abdominal y disminución de hemoglobina, con hallazgos de líquido libre e inestabilidad hemodinámica. Se utilizó la maniobra de Pringle y técnicas avanzadas de hemostasia durante la cirugía emergente, seguida de análisis histopatológico del tejido hepático resecado.



Fig.2 Se observa tumoración en corte sagital.

RESULTADOS/CASO CLÍNICO

El examen intraoperatorio reveló tejido hepático necrótico y sangrante. El control del sangrado se logró eficazmente sin complicaciones posoperatorias. El diagnóstico histopatológico confirmó un tumor rabdoide con deficiencia en la expresión de SMARCB1, destacando la agresividad y la rareza de este tumor.

CONCLUSIÓN

Este caso subraya la importancia de la detección temprana y la intervención quirúrgica en tumores hepáticos raros como el tumor rabdoide. La investigación continua es crucial para desarrollar estrategias terapéuticas más efectivas, dado el pronóstico generalmente desfavorable de estos tumores.



Fig.1 Se observa tumoración en corte axial.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

A pesar de su rareza, los tumores rabdoides del hígado deben considerarse en el diagnóstico diferencial de hemorragia intraabdominal grave. La falta de síntomas y signos específicos complica su diagnóstico temprano. El papel de la cirugía es primordial, aunque los desafíos terapéuticos persisten debido a la falta de tratamientos médicos efectivos y a la alta tasa de recurrencia y metástasis.

REFERENCIAS

1. Ye H, Liu Z, Zhang Y. Malignant rhabdoid tumor of the liver in a middle-aged woman: a case report and literature review. BMC Gastroenterology. 2022;22:28. doi:10.1186/s12876-022-02102-6.
2. Marzano E, Lermite E, Nobili C, et al. Malignant rhabdoid tumour of the liver in the young adult: report of first two cases. HPB Surg World J Hepatic Pancreat Biliary Surg. 2009;2009:628206. doi:10.1155/2009/628206.
3. Sibileau E, Moroch J, Teyssedou C, Aube C. Malignant rhabdoid tumors of the liver: an exceptional tumor in adults—a case report and literature review. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23(1):104–8. doi:10.1097/MEG.0b013e328341305a.