



12°
CONGRESO

DE LA
ASOCIACIÓN MEXICANA HEPATO PANCREATO BILIAR

Esplenosis heterotópica tras pancreatectomía subtotal y esplenectomía postraumática: reporte de caso.

Romero-Garcia, M.; López-Zamora, E. ; Ramírez-López, C. ; Ortiz-Arizmendi, L. ; Zavala-Cardona, C. ; López-Garnica, D.
TecSalud. Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.

INTRODUCCIÓN

La esplenosis es una patología benigna que resulta del autotrasplante heterotópico generado tras una ruptura esplénica o traumatismo. Aunque usualmente la esplenosis se encuentra en la cavidad abdominal o en el hueco pélvico, se han reportado casos intratorácicos, intrahepáticos o subcutáneos. Es común la identificación radiológica de la esplenosis años o incluso décadas después del evento traumático.

Exponer el caso clínico de esplenosis tras pancreatectomía subtotal y esplenectomía postraumática, como una entidad frecuente pero subdiagnosticada, cuya presencia debe ser considerada en el seguimiento postquirúrgico debido a su capacidad de mimetizar neoplasias o generar dolor crónico de causa no explicable.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizó el caso de un paciente masculino de 15 años de edad en el sistema digital ALERT®v12.1. del Hospital San José, TecSalud. Se revisó el expediente clínico completo, incluyendo imágenes radiológicas, se realizó una búsqueda sistemática de literatura en el motor de búsqueda PubMed® NCBI y se llevó a cabo un análisis del caso.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 15 años de edad con antecedentes quirúrgicos de:

-Laparotomía exploradora, hepatorrafia, pancreatectomía distal y esplenectomía. .

-Secundario a traumatismo abdominal contuso. Con egreso al día 20 postoperatorio, con presencia de fístula pancreática grado B con manejo conservador con drenaje percutáneo. Durante el seguimiento posquirúrgico, un año posterior al evento traumático, se identifica una imagen de morfología irregular con densidad homogénea, que actualmente mide 24 x 21 x 21 mm, sugiriente de esplenosis. El paciente se encuentra asintomático, sin dolor crónico.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La esplenosis en pacientes postoperados de pancreatectomía subtotal y esplenectomía postraumática es una entidad común posterior a cirugía esplénica o trauma; sin embargo, es una patología infradiagnosticada que puede presentarse de manera incidental o sintomática. Puede generar dolor crónico o incluso ser confundida con neoplasias en el seguimiento de un paciente quirúrgico. Reconocer su presencia es crucial para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios.

REFERENCIAS

- 1) Lake, S. T., Johnson, P. T., Kawamoto, S., Hruban, R. H., & Fishman, E. K. (2012). CT of Splenosis: Patterns and Pitfalls. American Journal of Roentgenology, 199(6), W686–W693.
- 2) Fremont, R. D., & Rice, T. W. (2007). Splenosis: A Review. Southern Medical Journal, 100(6), 589–593.
- 3) Vernuccio, F., Dimarco, M., Porrello, G., Cannella, R., Cusmà, S., Midiri, M., & Brancatelli, G. (2020). Abdominal splenosis and its differential diagnoses: what the radiologist needs to know. Current Problems in Diagnostic Radiology.

